

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES E GATOS

Julho 2015

NOME VACINA	TITULAR A.I.M.	IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
EURICAN CHPPi2-L	MERIAL PORTUGUESA - SAÚDE ANIMAL, LDA	1 ano	<p>Administrar por via subcutânea 1 dose de 1ml, de acordo com o seguinte esquema de vacinação:</p> <p>Primovacinação:</p> <p>1ª Injeção: A partir da 7ª semana de idade. 2ª Injeção: 3 a 5 semanas mais tarde, mas sempre a partir da 12ª semana de idade.</p> <p>Revacinação Anual.</p> <p>Ressuspender o liofilizado na fração líquida.</p>
Eurican CHP-LR (HEXADOG)	MERIAL PORTUGUESA - SAÚDE ANIMAL, LDA	1 ano	<p>Administrar por via subcutânea 1 dose de 1ml, de acordo com o seguinte esquema de vacinação:</p> <p>Primovacinação:</p> <p>1 Injeção de vacina Hexadog, após 3 meses de idade. 1 Injeção de vacina da Merial contra a esgana, a adenovirose, a parvovirose e a leptospirose, 1 mês antes ou após a de Hexadog.</p> <p>Revacinação: Anual.</p>
NOBIVAC RABIES	MSD Animal Health (INTERVET)	3 anos	<p>Administrar 1 ml de vacina por injeção intramuscular ou subcutânea.</p> <p>Primovacinação:</p> <p>Aos 3 meses (A primovacinação pode ser administrada mais cedo, mas deve ser administrada uma revacinação aos 3 ou 6 meses, dependendo da espécie)</p> <p>Revacinação:</p>

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES E GATOS

Julho 2015

			Aos 3 anos (O intervalo recomendado para a revacinação é baseado nos resultados das experiências de contraprova. De acordo com a legislação em vigor, a revacinação poderá ocorrer mais cedo)
PUREVAX RABIES suspensão injectável	MERIAL França	Gatos: Duração da imunidade após a primovacinação: 1 ano. Duração da imunidade após revacinação: 3 anos.	Via subcutânea. Administrar uma dose de 1 ml, de acordo com o seguinte esquema de vacinação: Primovacinação: 1 injeção a partir das 12 semanas de idade. Revacinação: 1 ano após a primovacinação, depois em intervalos de até 3 anos. Países visitados que requerem o teste de serologia da raiva: a experiência demonstrou, que alguns animais vacinados, embora protegidos, podem não ter o título de anticorpos, requerido por alguns países - 0,5 UI/ml. Os médicos veterinários podem considerar realizar duas vacinações. A melhor altura para a colheita de uma amostra de sangue é cerca dos 28 dias após a vacinação.
RABDOMUN	LABORATÓRIOS PFIZER, LDA.	Cães: 3 anos Gatos: 2 anos	Administrar 1 ml por via subcutânea, a partir dos 3 meses de idade. Os cães e gatos inoculados antes das doze semanas de idade devem ser revacinados nessa altura, ou o mais próximo possível. <i>Revacinação:</i> Os animais devem ser revacinados com uma dose (1 ml). Cães: 3 em 3 anos. Gatos: 2 em 2 anos.
RABIGEN MONO	VIRBAC DE PORTUGAL LABORATÓRIOS	1 ano	1 ml de vacina por injeção intramuscular ou subcutânea. <i>Primovacinação:</i> Uma única administração a partir dos 3 meses.

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES E GATOS

Julho 2015

			Revacinação: Anual
RABISIN	MERIAL PORTUGUESA - SAÚDE ANIMAL, LDA	1 ano após a vacinação primária e depois em intervalos até 3 anos.	Administrar por injeção intramuscular ou subcutânea. Vacinação primária: 1 injeção a partir de 12 semanas* de idade, seguida de uma 2ª injeção 1 ano depois. Revacinações: Em intervalos até 3 anos** *No caso de cão ou gato que tenha sido vacinado antes das 12 semanas de idade, o esquema de vacinação primária deve ser completado por uma injeção dada às 12 semanas de idade ou mais. **Em todo o caso, o período de vacinação deve cumprir com a legislação nacional em vigor
VACINA ANTI-RÁBICA	MEDINFAR-SOROLÓGICO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, S.A.	1 ano	Administrar por via subcutânea ou intramuscular uma dose de 1 ml por animal. Primovacinação: Administrar uma dose de vacina a partir da 12ª semana de vida. Caso os animais (cães e gatos) tenham recebido uma primeira dose antes das 12 semanas de vida, deve ser-lhes administrada uma segunda dose a partir da 12ª semana de vida, logo que possível. Revacinação: Anual.
VANGUARD R	ZOETIS BELGIUM SA	1 ano após primovacinação Depois 2 anos	Uma única injeção na dose de 1 ml é suficiente independentemente da idade, peso ou raça do animal. Administrar por via subcutânea ou intramuscular. Primovacinação:

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES E GATOS

Julho 2015

			<p>Todos os animais das espécies-alvo podem ser vacinados a partir da 12ª semana de idade. A primovacinação é com uma dose única da vacina.</p> <p><i>Revacinação:</i> Os animais devem ser revacinados com uma dose, um ano após a primovacinação. As revacinações após o primeiro reforço (administrado 1 ano após a primovacinação) devem ser realizadas em cada 2 anos, com uma só dose de vacina.</p>
VERSICAN DHPPI/L3R	ZOETIS BELGIUM SA	1 ano	<p>Administrar a vacina reconstituída (1 ml) por via subcutânea.</p> <p><i>Primovacinação:</i> Duas doses do medicamento veterinário com intervalo de 2 a 4 semanas. A primeira dose pode ser administrada a partir das 8 semanas de idade. A segunda dose não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade. A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. Assim, a primeira dose pode ser administrada com Versican DHPPI/L3 se se pretender apenas administrar uma só dose da valência da raiva (consultar o RCM da Versican DHPPI/L3).</p> <p><i>Revacinação:</i> Revacinação anual com dose única de Versican DHPPI/L3R.</p>
Versican Plus DHPPI/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães (25 e 50 frascos)	ZOETIS BELGIUM SA	Pelo menos 3 anos após a primovacinação para CDV, CAV-1, CAV-2 e CPV. A duração de imunidade contra o CAV-2 não foi estabelecida. Foi demonstrado que 3 anos após a vacinação ainda estão presentes anticorpos CAV-2.	<p><i>Primovacinação:</i> Duas doses do medicamento veterinário com intervalo de 3-4 semanas, a partir das 8-9 semanas de idade. A segunda dose não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade.</p> <p><i>Esquema de revacinação:</i></p>

LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES E GATOS

Julho 2015

		<p>Considera-se que a duração da resposta imunitária protetora contra doença respiratória associada ao CAV-2 é de pelo menos 3 anos.</p> <p>Pelo menos um ano após a primovacinação para CPiV, componentes da <i>Leptospira</i> e raiva. A duração da imunidade para a raiva foi demonstrada após uma vacinação às 12 semanas de idade.</p>	<p>Uma dose única de Versican Plus DHPPi/L4R deve ser administrada com intervalos de 3 anos. Deve realizar-se a revacinação anual para parainfluenza, leptospira e raiva, pelo que, quando necessário, anualmente pode ser administrada uma dose única da vacina compatível Versican Plus Pi/L4R.</p>
<p>Versican Plus Pi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães (25 e 50 frascos)</p>	<p>ZOETIS BELGIUM SA</p>	<p>Pelo menos um ano após a primovacinação para todos os componentes da Versican Plus Pi/L4R. A duração da imunidade para a raiva foi demonstrada após uma vacinação às 12 semanas de idade.</p>	<p>Duas doses Versican Plus Pi/L4R com intervalo de 3-4 semanas, a partir das 8-9 semanas de idade. A segunda dose não deve ser administrada antes das 12 semanas de idade.</p> <p>Esquema de revacinação: Revacinação anual com dose única de Versican Plus Pi/L4R.</p>